

**Дезинфекционные мероприятия при вирусных инфекциях дезинфицирующими средствами**

**«Ди-Хлор» и «Хлорные таблетки №1»**

Объекты обеззараживания	«Ди-Хлор»		«Хлорные таблетки №1»		Способ обеззараживания
	Концентрация рабочего раствора %	Экспозиция в мин	Концентрация рабочего раствора %	Экспозиция в мин	
Поверхности в помещениях, жесткая мебель	0,03	30	0,015 0,03	30 15	Протирание или орошение
Санитарно-техническое оборудование	0,06	60	0,015 0,03	30 15	2-х кратное протирание или 2-хкратное орошение с интервалом 15 мин
Посуда без остатков пищи	0,015	15	0,015	15	погружение
Посуда с остатками пищи	0,1	120	0,075	30	погружение
Посуда лабораторная	0,1	120	0,075	30	погружение
Белье загрязненное	0,2	120	0,075	60	замачивание
Белье незагрязненное	0,015	60	0,015	30	замачивание
Уборочный инвентарь	0,2	120	0,06	60	замачивание
Игрушки	0,06	15	0,06 0,075	30 15	Протирание погружение, орошение
Предметы ухода за больным	0,06 0,1	90 60	0,06 0,075	30 15	Протирание и погружение

## Приготовление рабочих растворов

Рабочие растворы средства готовят путем добавления средства к питьевой воде комнатной температуры

<b>Таблетки « Ди-Хлор»</b>		
Концентрация рабочего раствора	Количество таблеток в штуках	Количество воды для приготовления рабочего раствора, л
0,015 % р-р	1	10
0,03 % р-р	2	10
0,06 % р-р	4	10
	2	5
0,1 % р-р	7	10
	3,5	5
0,2 % р-р	14	10
	7	5

<b>Таблетки «Хлорные таблетки №1»</b>		
Концентрация рабочего раствора	Количество таблеток в штуках	Количество воды для приготовления рабочего раствора, л
0,015 % р-р	1	10
	0,5	5
0,03% р-р	2	10
	1	5
0,06 % р-р	4	10
	2	5
0,075% р-р	5	10
	2,5	5

Норма расхода рабочего раствора при орошении из «Квазара» - 150 мл/кв.м.

Все работы проводить с использованием СИЗ: с защитой кожи рук резиновыми перчатками, органов дыхания респираторами, глаз – герметичными очками.

После окончания дезинфекции следует сделать влажную уборку, помещение проветривается.